

actapulgate® 3g

enfants et adultes
poudre pour suspension buvable en sachet
USAGE HOSPITALIER

1- IDENTIFICATION DU MEDICAMENT :

DENOMINATION :

ACTAPULGITE 3 g enfants et adultes, poudre pour suspension buvable en sachet.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :

Attapulgate de Mormoiron activée 3 g
Glucose monohydraté q.s.p un sachet de 5.7g

FORME PHARMACEUTIQUE :

Poudre pour suspension buvable.

Boite de 100 sachets.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

ADSORBANT INTESTINAL.

2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique des manifestations fonctionnelles intestinales notamment avec météorisme et diarrhée.

3- ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT :

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas de sténose (rétrécissement) du tube digestif.

MISES EN GARDE SPECIALES :

En cas de diarrhée abondante, de présence de sang ou de glaires dans les selles, comme en cas de fièvre ou de vomissements ou autres signes digestifs associés, IL CONVIENT DE CONSULTER IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Chez le malade habituellement alité, ou dont l'activité physique est très réduite, un examen médical est nécessaire avant tout traitement par ce médicament.

En cas de diabète ou de régime hypoglycémique (pauvre en sucre), tenir compte de la teneur en glucose (2,7 g par sachet).

Ballonnement, flatulences :

Eviter les légumes secs (lentilles, pois...), certains légumes verts (choux...).

Diarrhée :

La diarrhée entraîne une perte de liquides qu'il est nécessaire de compenser.

Ceci est particulièrement important chez l'enfant : en cas de diarrhée aiguë, une réhydratation précoce par voie orale (solution de réhydratation) ou par voie intraveineuse s'impose.

Si la diarrhée persiste au-delà de 2 jours, CONSULTER VOTRE MEDECIN.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

Les adsorbants intestinaux peuvent diminuer l'effet de nombreux autres médicaments. Par précaution, il convient d'espacer les prises de 2 heures entre ACTAPULGITE et un autre médicament.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT :

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

4- COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

POSOLOGIE :

- Chez l'adulte : 2 à 3 sachets par jour
- Chez l'enfant de plus de 10 kg : 2 sachets par jour

MODE ET VOIE D'ADMISTRATION :

Voie orale.

Afin d'obtenir un mélange parfaitement homogène et de goût agréable, il est recommandé de mélanger à sec ce médicament avec du sucre en poudre avant adjonction d'eau.

FRÉQUENCE ET MOMENT AUXQUELS LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ :

Ce médicament est à prendre de préférence avant les repas.

5- EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS :

- Possibilité de constipation en cas d'utilisation prolongée.

AMM N° : 925 303 H

CECI EST MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et contre-indication.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le prenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS

AP101/03



Fabriqué par les Laboratoires **TERIAK**
Sous licence **BEAUFOUR IPSEN Pharma**
CHEYLUS 1111 ZAGHOUAN

BEAUFOUR IPSEN
Pharma