



# bedelix®

## 1- IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### DENOMINATION :

BEDELIX, poudre pour suspension buvable.

### COMPOSITION QUANTITATIVE :

Montmorillonite beidellitique (Monmectite) : 3,000 g par sachet.

### COMPOSITION QUALITATIVE :

Montmorillonite beidellitique (Monmectite), gel d'hydroxyde d'aluminium et de carbonate de magnésium codesséchés, extrait de réglisse, saccharine sodique, glucose hydraté, vanilline. q.s.p un sachet de 3,925 g

### FORME PHARMACEUTIQUE :

Poudre pour suspension buvable.

Boîte de 30 sachets.

### CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

PROTECTEUR DES MUQUEUSES GASTRO-OESOPHAGIENNES ET GASTRO-  
INTESTINALES.

(A : Appareil digestif et métabolisme)



## 2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

### Indications

Ce médicament est préconisé dans le traitement des troubles fonctionnels digestifs, notamment dans les ballonnements et les douleurs abdominales ainsi que dans les douleurs gastriques

## 3- ATTENTION !

### DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

#### Contre-indications

- Affections sténosantes du tube digestif (rétrécissement)

*EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE  
MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Chez les dialysés chroniques ce produit ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée sans avis médical, en raison de la présence d'hydroxyde d'aluminium.

*EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE  
MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

Pour éviter tout risque d'interférence sur l'absorption digestive d'éventuels médicaments associés il est conseillé d'administrer ces derniers à distance de la prise du produit (au moins 2 heures).

*AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS  
MEDICAMENTS. II FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE  
TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.*

## **GROSSESSE ET ALLAITEMENT :**

*D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MÉDICAMENT.*

## **4- COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT?**

### **POSOLOGIE :**

- Voie orale

Adulte : 3 sachets par jour en moyenne  
Enfants : avant 2 ans : ½ sachet 1 à 2 fois par jour  
: de 2 à 5 ans : ½ sachet 2 à 3 fois par jour  
: 5 à 10 ans : 1 sachet 2 fois par jour

- Voie rectale

1 à 3 lavements à garder par jour. Pour chaque lavement, 1 à 3 sachets délayés dans 100 ml d'eau tiède.

### **MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :**

- Voie orale

Le contenu d'un sachet peut être délayé dans un demi-verre d'eau ou mélangé à un aliment semi-liquide comme bouillie, compote, purée etc...

- Voie rectale

Le contenu du ou des sachets doit être délayé dans 100 ml d'eau tiède.

## **FREQUENCE ET MOMENTS AUXQUELS LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ :**

Administrer de préférence entre les repas ou un peu avant

### **DURÉE DU TRAITEMENT :**

Respectez la prescription de votre médecin

## **5- EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS :**

*SIGNALER À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.*

## **6- CONSERVATION :**

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

## **7- PRÉSENTATION :**

AMM N° : 925 305 1

### **CECI EST MÉDICAMENT**

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et contre-indication.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le prenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

**TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS**



Fabriqués par les Laboratoires **TERIAK**  
Sous licence **BEAUFOR IPSEN Pharma**  
CHEYLUS 1111 ZAGHOUAN

**BEAUFOR IPSEN**  
Pharmas

AP003/05