

MEFENAL[®] 250mg

Acide ménémanique

Gélules

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien

1/ IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

Acide ménémanique 250,00 mg

Excipients : lactose monohydraté, stéarate de magnésium q.s.p une gélule n° 1

Enveloppe de la gélule : Tête : gélatine, dioxyde de titane, bleu brillant ; Corps : Gélatine, dioxyde de titane

Forme pharmaceutique

Gélule, boîte de 20

Classe thérapeutique

ANTI-INFLAMMATOIRE, ANTIRHUMASTISMALE, NON STEROÏDIEN

2/ DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est indiqué, chez l'adulte et l'enfant de plus de 12 ans :

- dans les douleurs d'intensité légère à modérée diverses, telles que maux de tête et douleurs dentaires
- dans les douleurs de l'appareil locomoteur
- dans les règles douloureuses
- dans les règles trop abondantes et de cause inexpliquée, après recherche de la cause

3/ ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Contre-indications :

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée)
- antécédent d'allergie ou d'asthme déclenché par la prise de ce médicament ou un autre médicament apparenté, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'aspirine
- antécédent d'allergie à l'un des constituants de la gélule
- si vous avez un ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution
- en cas de maladie grave du foie
- en cas de maladie grave du rein
- en cas de maladie grave du cœur
- chez un enfant de moins de 12 ans

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

MISES EN GARDE

PREVENIR VOTRE MEDECIN en cas :

- d'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez notamment chez certains sujets allergiques à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien. L'administration de ce médicament peut entraîner une crise d'asthme.
- de traitement anticoagulant concomitant, ce médicament pouvant entraîner des manifestations gastro-intestinales graves
- de maladie du cœur, du foie ou du rein
- de varicelle. Ce médicament est déconseillé en raison d'exceptionnelles infections graves de la peau
- d'antécédents digestifs (hernie hiatale, hémorragies digestives, ulcère de l'estomac ou du duodénum ancien...)
- en raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

INTERROMPRE IMMEDIATEMENT LE TRAITEMENT en cas :

- d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche, présence de sang dans les selles ou coloration des selles en noir),
- d'éruption cutanée, de crise d'asthme, de gonflement du visage ou du cou ou d'autres signes d'allergie
- de diarrhée.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, ou avez pris récemment d'autres médicaments, notamment des anticoagulants oraux et d'autres médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens y compris l'aspirine et ses dérivés.

Autres Héparine, Lithium, Méthotrexate (à doses supérieures à 15 mg/semaine) ou d'un antihypertenseur.

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : l'acide ménémanique.

Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou de l'aspirine ou ses dérivés.

Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou d'aspirine.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN MEME S'IL S'AGIT D'UN MEDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE

Grossesse et allaitement :

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Grossesse :

De 2,5 à 5 mois de grossesse révolus, l'utilisation prolongée de MEFENAL est fortement déconseillée.

Au-delà de 5 mois de grossesse révolus, MEFENAL ne doit être utilisé EN AUCUN CAS, car ses effets peuvent avoir des conséquences graves sur la santé de votre enfant, et cela même avec une seule prise.

Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez enceinte de plus de cinq mois révolus, parlez-en à votre médecin afin qu'une surveillance adaptée vous soit proposée.

Allaitement :

En cas d'allaitement, l'utilisation de ce médicament est à éviter.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT

CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINE

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des vertiges, une somnolence, une vision trouble.

LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE : lactose monohydraté

4/ COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

Posologie :

2 à 6 gélules par jour, à avaler avec un grand verre d'eau au moment des repas.

Mode et Voie d'administration :

Voie orale

Durée du traitement :

Se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

Si vous avez l'impression que l'effet de MEFENAL, gélule est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Conduite à tenir en cas de surdosage :

En cas de surdosage, arrêter le traitement et consulter rapidement un médecin

Conduite à tenir au cas ou l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

5/ EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Effets indésirables

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants :

Certains effets sont rares mais graves. Il est indispensable d'arrêter immédiatement le traitement et d'avertir votre médecin en cas :

- d'hémorragie digestive (rejet de sang par la bouche, présence de sang dans les selles, coloration des selles en noir), ces hémorragies sont d'autant plus fréquentes que la posologie utilisée est élevée.
- de réactions allergiques :

- * cutanées de type éruption, démangeaisons

- * respiratoires de type crise d'asthme

- * générales : malaise brutal avec chute de la pression artérielle (choc anaphylactique).

- Exceptionnellement, des infections graves de la peau ont été observées en cas de varicelle.

Certains autres effets nécessitent seulement d'avertir votre médecin. Lui seul peut juger de la conduite à tenir en cas :

- de troubles digestifs de type douleurs abdominales, vomissements, nausées, de vertiges, de somnolence, de maux de tête, de troubles visuels, d'augmentation de la sudation, de palpitations, d'essoufflement.

- * Des cas d'insuffisance rénale ont pu être observés.

- * Des modifications biologiques peuvent nécessiter éventuellement un contrôle des bilans sanguin, hépatique et rénal.

SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE

6- CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur

A ne pas laisser à la portée des enfants

7- PRESENTATION

AMM N° : 925 354 2

CECI EST MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et contre-indication.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le prenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS

Fabriqué par les Laboratoires TERIAK
CHEYLUS 1111 ZAGHOUAN

AP08001