



Magnésium® Teriak

Carbonate de magnésium

60 Comprimés

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice car elle contient des informations importantes pour vous

Ce médicament peut être obtenu sans prescription médicale. Vous devez néanmoins l'utiliser avec le plus grand soin pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats

• La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles, imposent de prendre un avis médical

• Garder cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire

• Si vous avez besoin d'informations ou de conseils, consultez votre pharmacien

1/IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

Carbonate de magnésium 395,85 mg

quantité correspondant à magnésium élément 100,00 mg

Excipients : amidon de maïs prégélatinisé, fumarate de stéaryle sodique.....q.s.p un comprimé

Forme pharmaceutique

Comprimé, boîte de 60.

Classe thérapeutique

SUPPLEMENT MINERAL (A : appareil digestif et métabolisme).

2/DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est indiqué dans les carences en magnésium confirmées par votre médecin.

3/ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Contre-indications :

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- allergie à l'un des constituants

- insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure à 30 ml/min).

- enfant de moins de 6 ans, en raison du risque de fausse-route.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

PRECAUTIONS D'EMPLOI

En CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, II FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN MEME S'IL S'AGIT D'UN MEDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE.





Grossesse et allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

4/COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

Posologie

Adulte : 3 à 4 comprimés par jour.

Enfant : 1 à 4 comprimés par jour.

Mode et voie d'administration

VOIE ORALE.

Les comprimés doivent être avalés avec un demi-verre d'eau.

Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré

La dose journalière est à répartir de préférence en plusieurs prises avant ou au cours des repas.

Durée du traitement

Le traitement sera interrompu dès que le taux de magnésium dans le sang sera revenu à la normale.

5/EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Effets indésirables

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants : diarrhées, douleurs abdominales, réactions de type allergiques.

SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

6- CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

7- PRESENTATION

AMM N° : 925 368 1

CECI EST MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et contre-indication.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le prenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS



Fabriqué par les Laboratoires **TERIAK**
CHEYLUS 1111 ZAGHOUAN

AP096/02

