

Décontractyl®

B A U M E
POMMADE - TUBE DE 80g

Que contient Décontractyl baume ?

Méphénésine 10,00 g - Nicotinate de méthyle 1,00 g - Excipients : macrogol 300, macrogol 4000, alcool cétylique, huile essentielle de lavande, huile essentielle de bergamote q.s.p. 100 g de pommade.
Pommade - Tube de 80 g

A quelle classe pharmaco-thérapeutique appartient Décontractyl baume ?

A visée antalgique (M. Système locomoteur)

Dans quels cas utiliser Décontractyl baume ?

Traitement local d'appoint des douleurs d'origine musculaire de l'adulte.

Quelles sont les contre-indications de Décontractyl baume ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- Allergie à l'un des composants.
- Sur les muqueuses, les yeux, sur une plaie.
- Ne pas appliquer sur une peau lésée.
- Ne pas utiliser sous pansement occlusif (fermé).
- Enfants ayant des antécédents de convulsions dues à la fièvre ou non (en raison de la présence de dérivés terpéniques dans la formule).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

A quoi en outre faut-il faire attention ?

Cette spécialité contient des dérivés terpéniques qui peuvent entraîner, à doses excessives, des accidents neurologiques à type de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant.

Respectez les conseils d'utilisation :

- ne jamais appliquer une dose supérieure à celle qui est recommandée (cf rubrique posologie),
- ne pas appliquer sur une surface étendue du corps,
- respecter la fréquence et la durée de traitement préconisées.

Quelles sont les précautions d'emploi à respecter ?

Ce médicament est réservé à l'adulte.

En cas d'épilepsie ancienne ou récente, DEMANDER CONSEIL A VOTRE MÉDECIN.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

AP016/04



INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament et en aucun cas il ne devra être appliqué sur les seins.
D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

EXCIPIENTS AYANT UN EFFET NOTOIRE

Dérivés terpéniques (cf Effets non souhaités et gênants).



Comment utiliser Décontractyl baume ?

RÉSERVÉ À L'ADULTE.

Posologie : Appliquer l'équivalent d'une noisette de baume sur la région douloureuse plusieurs fois par jour en frictions douces et prolongées ou en massages d'une dizaine de minutes. Se laver les mains après utilisation.

Mode et voie d'administration : voie cutanée.



Durée d'un traitement avec Décontractyl baume

Ne pas utiliser de façon prolongée sans avis médical.



Effets non souhaités et gênants de Décontractyl baume

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS, notamment risque d'allergie à l'un des composants nécessitant l'arrêt du traitement.
En raison de la présence, en tant qu'excipients, de dérivés terpéniques et en cas de non respect des doses préconisées

- risque de convulsions chez l'enfant et chez le nourrisson,
- possibilité d'agitation, de confusion chez les sujets âgés.

NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET À SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS LA NOTICE.



Conservation de Décontractyl baume

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

AMM N° : 925 328 1

CECI EST UN MÉDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
 - Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
 - Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
 - Suivez les conseils de votre pharmacien.
 - Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et contre-indications.
 - N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
 - Ne le reprenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.
- TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS**



Fabriqué par **TERRIAK** CHEYLUS 1111 ZAGHOUAN
Sous-licence **sanofi synthelabo** - otc - France

