

dicetel[®] 100 pinavérium 100 mg comprimé pelliculé

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé ?
3. COMMENT PRENDRE DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique
ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans :

- les douleurs des maladies digestives ou biliaires

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Ne prenez jamais DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé :

En cas d'hypersensibilité (allergie) au bromure de pinavérium ou à l'un des constituants.

EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Du fait d'un risque d'atteintes de l'œsophage, il est important de respecter scrupuleusement le mode d'administration de DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé (voir rubrique 3).

Les patients avec des lésions œsophagiennes préexistantes et/ou hernie hiatale doivent être très attentifs au respect du mode d'administration.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse - Allaitement

Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter l'utilisation du bromure de pinavérium au cours de la grossesse et de l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informez votre médecin si vous êtes enceinte ou susceptible de l'être ou si vous allaitez.

Liste des excipients à effet notable : lactose.

3. COMMENT PRENDRE DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé ?

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie
La posologie est de 2 comprimés par jour en deux prises. Exceptionnellement, cette posologie peut être augmentée à 3 comprimés par jour.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec un grand verre d'eau.

Ne pas sucer ni croquer les comprimés. Ne pas prendre les comprimés en position allongée ni juste avant l'heure du coucher.

Fréquence d'administration

Un comprimé matin et soir au milieu du repas.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

A des posologies supérieures à 600mg, des troubles digestifs tels que diarrhées, nausées, vomissements et douleurs abdominales peuvent survenir.

Si vous avez pris plus de DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

En cas de prise importante de comprimés, contactez immédiatement votre médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Risque d'atteintes de l'œsophage en cas de non respect du mode d'administration (voir rubrique 3 «Posologie et mode d'administration »).

Réactions d'hypersensibilité (allergie, œdème)

Si vous avez une réaction allergique, arrêtez de prendre ce médicament et prévenez votre médecin immédiatement. Les signes peuvent inclure dans de rares cas :

- un gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, avec des difficultés pour respirer (œdème),
- Arrêtez de prendre DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé et prévenez votre médecin immédiatement si vous remarquez des effets indésirables mentionnés ci-dessus.

Autres effets indésirables :

- Troubles digestifs tels que douleurs abdominales, diarrhées, nausées, vomissements et digestion difficile,
- Troubles cutanés tels que des éruptions cutanées, démangeaisons et rougeurs.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Conditions de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

La substance active est :

Bromure de pinavérium 100,00 mg
Pour un comprimé pelliculé.

Les autres composants sont :

Silice colloïdale anhydre, cellulose microcristalline, talc, stéarate de magnésium, amidon de maïs prégélatinisé, lactose monohydraté.

Pelliculage : copolymère basique de méthacrylate de butyle, talc, laurylsulfate de sodium, acide stéarique, hypromellose, oxyde de fer jaune (E172), oxyde de fer rouge (E172).

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé, rond, biconvexe, de couleur jaunâtre à orange, gravé 100 sur une face. Boîte de 20 comprimés.

Fabriqué par les Laboratoires **TERIAK**
Sous licence **Abbott**
CHEYLUS 1111 ZAGHOUAN

Abbott
AP050000



بينافيريوم 100 مغلف

ديستيل 100

يجب قراءة كامل هذه النشرة بانتباه قبل تناول هذه الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة، قد تحتاج إلى إعادة قرائتها من جديد.
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات من الطبيب أو من الصيدلي.
- قد تم وصف هذا الدواء لك بشكل شخصي، لا تقم بإعطائه لشخص آخر، حتى في حال وجود أعراض مشابهة، لأنك قد تسبب الضرر له.
- إذا أصبح إحدى الأعراض غير المرغوب فيها خطراً أو إذا لاحظت وجود أعراض غير مرغوب فيه غير مذكور في هذه النشرة، تحدث عن ذلك مع الطبيب أو مع الصيدلي.

في هذه النشرة :

- 1- ما هو ديستيل 100 مغلف، وما هي حالات استعماله ؟
- 2- ما هي المعلومات المطلوب معرفتها قبل تناول ديستيل 100 مغلف ؟
- 3- كيف يتم تناول ديستيل 100 مغلف ؟
- 4- ما هي الأعراض غير المرغوب فيها المحتملة ؟
- 5- كيف تتم المحافظة على ديستيل 100 مغلف ؟
- 6- معلومات إضافية.

- 1- ما هو ديستيل 100 مغلف، وما هي حالات استعماله ؟
- الغنة الدوائية - العلاجية**
- مضاد للتشنج العضلي.
- التعليمات العلاجية**
- يستعمل هذا الدواء في الحالات التالية:
- الام من جراء الأمراض العضلية أو الصفراوية
- 2- ماهي المعلومات المطلوب معرفتها قبل تناول ديستيل 100 مغلف،
- قرص مغلف؟**

قائمة المعلومات الضرورية قبل تناول الدواء

إذا سبق وأبلغك طبيبك بأنك تعاني من عدم تقبّل لبعض أنواع السكر، اتصل به قبل تناول هذا الدواء.

تواهي الاستعمال

لا تتناول أبداً ديستيل 100 مغلف، قرص مغلف:

في حال المعاناة من تحسس مفرد (حساسية) تجاه برومور بينافيريوم أو تجاه أحد المكونات.

في حال الشك، من الضروري أن تطلب رأي الطبيب أو الصيدلي.

احتياطات الاستعمال، تحذيرات خاصة

بسبب خطر إصابة المريء، من المهم الاحترام الدقيق لطريقة تناول ديستيل 100 مغلف، قرص مغلف (أنظر البند 3).

على المرضى الذين يعانون من إصابات موجودة في المريء أو من فتح الحجاب الحاجز أن يحتمروا بدقة طريقة تناول.

لا ينصح باستعمال هذا الدواء لدى المرضى الذين يعانون من عدم تقبّل الغالكتوز، نقص في لكتاز لاب أو من تآذر سوء امتصاص الغلوكوز أو الغالكتوز (أمراض وراثية نادرة).

تفاعلات مع أدوية أخرى

تناول أو استعمال أدوية أخرى

إذا كنت تتناول أو تتناول مؤخراً دواءً آخرًا، بما في ذلك دواء تم الحصول عليه دون وصفة طبية، تحدث عن ذلك مع الطبيب أو الصيدلي.

الاستعمال خلال الحمل والإرضاع

الحمل - الإرضاع

على سبيل الاحتياط، من الأفضل تفادي استعمال برومور بينافيريوم خلال الحمل والإرضاع.

يجب طلب رأي الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

يجب أن تبادري إلى إبلاغ الطبيب إذا كنت حاملاً أو يحتمل أن تكوني كذلك أو إذا كنت ترضعين.

قائمة سواغات لها تأثير بارز ، لاكتوز.

3- كيف يتم تناول ديستيل 100 مغلف، قرص مغلف؟

الجرعة، أسلوب و/ أو طريق (طرق) التناول، وتيرة التناول ومدة العلاج

المقدار

المقدار هو قرصان في اليوم على فترتين.

بصورة استثنائية، بالإمكان زيادة هذا المقدار إلى 3 قرص في اليوم.

طريقة وأسلوب التناول

عن طريق الفم.

يجب بلع الأقراص مع كأس كبير من الماء.

لا تمص الأقراص أو تضمعها. لا تتناول الأقراص في وضع متمد أو مباشرة قبل الخلود للنوم.

وتيرة تناول الدواء

قرص صباحاً ومساءً في وسط الوجبات الغذائية.

أعراض وتعليمات في حال تناول جرعة مفردة

مع جرعات تتوقف 600 ملغ، قد تحدث اضطرابات هضمية مثل الإسهال والغثيان والتقيؤ والألم البطنية.

إذا تناولت كمية من ديستيل 100 مغلف، قرص مغلف، أكثر مما ينبغي؛

في حال تناول كمية هامة من الأقراص، اتصل فوراً بالطبيب.

4- ماهي الأعراض غير المرغوب فيها المحتملة؟

مثل جميع الأدوية، قد يؤدي ديستيل 100 مغلف، قرص مغلف، إلى حدوث أعراض غير مرغوب فيها، حتى لو لم يكن الجميع عرضة لها.

أخطار حدوث إصابات في المريء في حال عدم احترام طريقة الاستعمال (أنظر البند 3 «المقدار وطريقة التناول»).

ردود فعل تحسّس مفرد (حساسية، وذمة)

إذا تعرّضت إلى ردّة فعل حسّاسية، توقّف عن تناول الدواء واتصل بطبيبك فوراً. يمكن أن تتضمن الاعلانات في حالات نادرة:

- انتفاخ في الوجه أو الشفاه أو اللسان أو الحلق، مع صعوبات بالتنفّس (وذمة).
- توقّف عن تناول ديستيل 100 مغلف، قرص مغلف، ويأدر إلى إبلاغ طبيبك فوراً إذا لاحظت ظهور أعراض غير مرغوب فيها مذكورة أعلاه.

أعراض أخرى غير مرغوب فيها:

- اضطرابات هضمية مثل آلام البطن والإسهال والغثيان والتقيؤ وصعوبة الهضم.
- اضطرابات جلدية مثل الطفح الجلدي والحكة والاحمرار.

إذا لاحظت ظهور أعراض غير مرغوب فيها لم يتم ذكرها في هذه النشرة، أو إذا تفاقمت بعض الأعراض غير المرغوب فيها، ياد إلى إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بذلك.

5- كيف تتم المحافظة على ديستيل 100 مغلف، قرص مغلف؟

يجب إبقاء الدواء بعيداً عن متناول أيدي ونظر الأطفال.

تاريخ انتهاء الصلاحية

لا تستعمل ديستيل 100 مغلف، قرص مغلف، بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العلبة.

شروط الحفظ

لا توجد احتياطات حفظ خاصة.

إذا ما لزم الأمر، تحذير ضد بعض إشارات التلف المرئية

يجب عدم رمي الأدوية في الجاربر أو مع النفايات المنزلية. إسأل الصيدلي حول ما هو مطلوب بالنسبة للأدوية غير المستعملة. تسمح هذه التدابير بالمحافظة على البيئة.

6- معلومات إضافية

قائمة كاملة بالواد النشطة واليساوغات

ماهي محتويات ديستيل 100 مغلف، قرص مغلف؟

المادة النشطة هي،

برومور بينافيريوم، 100.00 مغلف، قرص مغلف.

المكونات الأخرى هي؛

سيليس غرواني عديم الماء، سولوزول بلوري دقيق، تالك، ستيرات المغنسيوم، نشاء الذرة مسبق الأعداد الهلامي، لاكتوز أحادي الهيدرات.

الغشاء: كوبوليمير قاعدي من ميثاكريلات البوتيل، تالك، لوريلسلفات الصوديوم، حامض الستايريك، هيدرومليوز، أكسيد الحديد الأصفر (E172)، أكسيد الحديد الأحمر (E172).

الشكل الصيدلاني والمحتوى

ما هو ديستيل 100 مغلف، قرص مغلف، وما هو محتوى التغليف الخارجي؟
يقدّم هذا الدواء تحت شكل قرص مغلف، دائري، ثنائي التحدّب، بلون أصفر يعيل إلى البرتقالي، محفور 100 على جهة منه، علبة من 20 قرصاً.

إين هذا الدواء

- الدواء مستعطر ولكنه ليس كثيره من المستعترات.
- الدواء مستعطر يؤثر على مستحك.
- اتبع بدقة التعليمات الطبيب وطريقة الاستعمال المتوصو عليها.
- تعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- تأكفبب والصيدلاني هما المتعبران بالواد والبنهه وضربو.
- لا تلتصق بمد العلاج الممددة لك من نشاء مستك.
- لا تعد ولا تزده عليها دون استشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية أبداً في متناول أيدي الأطفال

CECI EST MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qui vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et contre-indication.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le prenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS



مخابر ترياق تحت رخصة من
أبوت

