

KLAROMIN® 250

Clarithromycine 250 mg

1- IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

Clarithromycine 250 mg

Excipients : croscarmellose sodique, amidon de maïs prégélatinisé, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, povidone, acide stéarique, talc, stéarate de magnésium, hydroxypropylcellulose, hypromellose, propylène glycol, mono-oléate de sorbitan, vanilline, dioxyde de titane, jaune de quinoléine, acide sorbique q.s.p. un comprimé

Forme pharmaceutique

Boîte de 14, comprimés pelliculés

Classe thérapeutique

ANTIBIOTIQUE ANTI-BACTERIEN de la famille des macrolides

(J : anti-infectieux)

2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT?

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans le traitement de certaines infections bactériennes à germes sensibles.

Il est également indiqué dans le traitement d'ulcère de l'estomac (duodénal ou gastrique)

3- ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT?

Contre-indications

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Allergie connue aux macrolides
- Certaines associations médicamenteuses (voir interactions médicamenteuses)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Prévenir votre médecin en cas d'insuffisance rénale ou hépatique sévère.

MISES EN GARDE SPECIALES

Prévenir votre médecin en cas :

- de baisse d'audition ou en cas de survenue de bruits perçus par vos oreilles comme des sifflements ou des bourdonnements, mais qui ne correspondent à aucun son extérieur.
- de colites pouvant survenir au cours du traitement.

Ce médicament ne doit pas être associé avec des médicaments qui peuvent être toxiques pour l'oreille, en particulier les aminosides.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

• Association contre-indiquée avec l'ergotamine et la dihydroergotamine (médicament de la migraine), le bédridil (médicament anti-angoreux), le cisapride (médicament anti-reflux), la mizolastine (anti-histaminique utilisé dans l'allergie) et le pimozide (neuroleptique utilisé pour certains troubles du comportement)

• Associations déconseillées : la bromocriptine, la cabergoline, le pergolide, l'ébastine, la toltérodine, l'halofantrine et la colchicine

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS. IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN MEME S'IL S'AGIT D'UN MEDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Allaitement

Ce médicament est susceptible de passer dans le lait maternel. Son utilisation est possible pendant l'allaitement sauf dans les cas suivants :

- Survenue de troubles digestifs chez le nouveau-né.
- Nouveau-né traité par un médicament contenant du cisapride (médicament anti-reflux) : risque d'interaction médicamenteuse.



D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MÉDICAMENT.

4- COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Posologie

La posologie est variable et doit être adaptée à chaque cas.

A titre indicatif :

La posologie usuelle chez l'adulte en klaromin 250 est de 500 mg à 2000 mg/jour, en 2 prises/jour. Elle dépend de l'indication, de la localisation de l'infection, du germe en cause et du poids du patient.

En cas de maladie ulcéreuse gastro-duodénale le schéma d'administration est le suivant : 1 comprimé matin et soir en association avec un autre antibiotique et un anti-ulcéreux pendant 7 jours, suivis par un traitement anti-ulcéreux pendant 3 à 5 semaines supplémentaires.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

Voie et mode d'administration

Voie orale

Les comprimés sont à avaler avec un verre d'eau, matin et soir de préférence avant les repas

Durée du traitement

Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé. La disparition de la fièvre ou de tout autre symptôme ne signifie pas que vous êtes complètement guéri. L'éventuelle impression de fatigue n'est pas due au traitement antibiotique mais à l'infection elle-même.

Conduite à tenir en cas de surdosage

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Conduite à tenir au cas où l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

5- EFFETS NON SOUHAITÉS ET GENANTS

Effets indésirables

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- Troubles digestifs : nausées, vomissements, douleurs d'estomac, diarrhée.
- Candidoses buccale (affection due à certains champignons microscopiques) : lésion inflammatoire de la langue, inflammation de la bouche.
- Réactions allergiques cutanées pouvant être exceptionnellement graves.
- Augmentation des transaminases (enzymes du foie) pouvant exceptionnellement provoquer une jaunisse
- Troubles auditifs réversibles à l'arrêt du traitement
- Troubles du goût
- Colorations dentaires habituellement réversibles avec des soins dentaires

SIGNALER À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE

6- CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur

7- PRÉSENTATION

AMM N° : 925 317 1

CECI EST UN MÉDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le prenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS



Fabriqué par les Laboratoires **TERIAK**
TERIAK Cheylus 1111 - Zaghouan

AP022/07

